

**Instruções para
coleta de amostra para**

ANÁLISE FOLIAR





Algodão: Coletar a quinta folha a partir do ápice, sem pecíolo, 80 dias após a emergência.



Feijão: Coletar, no florescimento, as terceiras folhas com pecíolo, tomadas no terço médio de 30 plantas.



Girassol: Coletar a quinta e a sexta folha abaixo do capítulo (cabeça), no florescimento. Amostrar 30 plantas por talhão.



Soja: Coletar, no início do florescimento, o terceiro trifólio (a partir do ápice) de 30 plantas.



Arroz: Coletar no mínimo 50 folhas bandeiras, no início do florescimento (50% das flores visíveis).



Milho: Coletar o terço central da folha abaixo e oposta à espiga, no início do florescimento.



Sorgo: Coletar, no florescimento, a quarta folha com a bainha visível, contada a partir do ápice das plantas.



Trigo: Coletar no mínimo 50 folhas bandeiras, no início do florescimento.




Café: Coletar o terceiro par de folhas, a partir do ápice dos ramos frutíferos localizados na altura média da planta, no início do verão (dez e jan). Deve-se amostrar um número igual de folhas para cada lado da linha do cafeeiro. Plantas anômalas não devem ser amostradas ou devem ser amostradas a parte. Amostrar 50 plantas para cada talhão homogêneo.



Pastagens: Coletar a parte que simula o pastejo do animal (brotação nova e folhas verdes), durante a fase de crescimento ativo, de novembro a fevereiro.



Citros: Coletar a terceira folha a partir do fruto, gerada na primavera, com 6 meses de idade, em ramos com frutos de 2 a 4 cm de diâmetro. Amostrar 4 folhas por árvore, em um total de 25 árvores por talhão.



Manga: Coletar folhas, no florescimento, do meio do último fluxo de vegetação e de ramos com flores na extremidade. Amostrar 4 folhas por árvore, em um total de 20 árvores por talhão.



Banana: Coletar 5 a 10 cm centrais da terceira folha a partir da inflorescência, eliminando-se a nervura central e metades periféricas.



Mamão: Coletar 15 pecíolos de folhas jovens totalmente expandidas e maduras com uma flor visível na axila.



Maracujá: Coletar terceira ou quarta folha a partir do ápice de ramos não sombreados.



Uva: Coletar folhas recém-maduras mais novas, contadas a partir do ápice dos ramos.



Alface: Coletar folhas recém-desenvolvidas na metade do ciclo da cultura.



Cana-de-açúcar: Coletar os 20 cm centrais da folha mais alta com o colarinho visível, excluindo-se a nervura central.



Eucalipto: Coletar folha recém-madura, normalmente penúltimo ou antepenúltimo lançamento de folhas nos últimos 12 meses.